

فهرست

۷	پیشگفتار
۹	سوالات ورودی دستیاری ۱۳۹۵
۱۲	پاسخنامه
۱۷	سوالات ورودی دستیاری ۱۳۹۶
۲۰	پاسخنامه
۲۵	سوالات ورودی دستیاری ۱۳۹۷
۲۸	پاسخنامه
۳۳	سوالات ورودی دستیاری ۱۳۹۸
۳۶	پاسخنامه
۴۱	سوالات ورودی دستیاری ۱۳۹۹
۴۴	پاسخنامه
۴۹	سوالات ورودی دستیاری ۱۴۰۰
۵۲	پاسخنامه
۵۷	سوالات ورودی دستیاری ۱۴۰۱
۶۰	پاسخنامه
۶۵	سوالات ورودی دستیاری ۱۴۰۲
۶۸	پاسخنامه
۷۲	پیوستها
۱۰۴	جمع‌بندی

پیشگفتار

بنده همان به که زقصیر خوبیش عذر بدرگاه خدای آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجای آورد دستهایم را به سمت آسمان تو بلند می کم، می خواهم بدانی که دستانم خالیست! اما شکرگزار تمام نعماتی هستم که به من اعطا نمودی حتی اگر اهلش نبودم.

اللَّهُمَّ مَوْلَايَ كَمْ مِنْ تَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشْرَتَهُ

همه ساله آزمون ورودی دستیاری توسط سازمان سنجش آموزش پزشکی برگزار شده و ملاک اصلی جهت ورود به دوره‌ی تخصصی دندانپزشکی می‌باشد. در این آزمون درس‌های مختلف، در رشته‌های مختلف ضرایب متفاوتی دارند و به طور عام تمامی درس‌ها در همان رشته دارای بیشترین ضریب، یعنی ضریب ۳ هستند. درس جراحی دهان، فک و صورت نیز برای این رشته ضریب ۳ را دارد که از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. منابع درس چراحی در این آزمون هر ساله توسط سازمان سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود و منابع امسال به شرح ذیل است. امید است همکاران دندانپزشک علاقه‌مند به رشته‌ی جراحی دهان، فک و صورت با تمرکز بیشتر روی متن کتاب و تمرین سوالات این کتاب، در زمرة‌ی همکاران آینده جراح ما قرار بگیرند.

منابع:

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, James Hupp, 2019

Malamed S. Handbook of Local Anesthesia, 2019

با تشکر و امید موفق روز افرون

دکتر علیرضا ابراهیم‌پور

۱۴۰۲ دی ماه

سوالات ورودی دستیاری ۱۳۹۵

۱- کدام یک از داروهای بی‌حسی زیر بیشتر است؟

- (ب) مهی واکائین
(د) پریلوکائین
(الف) لیدوکائین
(ج) پروکائین

۲- کدام یک از داروهای بی‌حسی موضعی زیر اثر دپرسیون قلبی کمتری دارد؟

- (ب) Ropivacaine
(د) Bupivacaine
(الف) Lidocaine
(ج) Etidocaine

۳- کدام یک از موارد زیر در انسداد راه هوایی به علت جسم خارجی، جزو علائم فاز اول است؟

- (ب) کاهش سطح تنفس
(د) تنفس پارادوکس بدون حرکت و صدا
(الف) کاهش سطح هوشیار
(ج) کاهش فشار خون

۴- تاریخ انقضای مصرف کدام یک از داروهای موجود در کیت اورژانس دندانپزشکی کمتر است؟

- (ب) آمپول هیدروکورتیزون
(د) قرص آسپرین
(الف) آمپول اپی نفرین
(ج) قرص نیتروگلیسیرین

۵- از داروی میدازولام در موارد اورژانسی زیر استفاده می‌شود، بجز:

- (الف) حمله آسم
(ب) حمله تشنجی ناشی از تزریق بیش از حد داروی بی‌حسی موضعی
(ج) سندروم هیپرونوتیلاسیون
(د) طوفان تیروئیدی

۶- کدام یک از علائم زیر جزء علائم زودرس سنکوب و ازودپرسور می‌باشد؟

- (ب) Tachycardia
(د) Cold hand and feet
(الف) Hyperpnea
(ج) Papillary dilation

۷- در کدام یک از موارد زیر بهتر است جلسه درمان دندانپزشکی به جای صبح به بعد از ظهر موقول شود؟

- (ب) بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب
(د) بیماران مبتلا به دیابت تحت درمان با انسولین
(الف) بیماران مبتلا به نارسایی تحت دیالیز
(ج) بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی

پاسخنامه

۱- گزینه «ج» صحیح است.

☞ فصل ۱ مالامد

Agent	pK _a	Percentage of Base (RN) at pH 7.4	Approximate Onset of Action (min)
Benzocaine	3.5	100	—
Mepivacaine	7.7	33	2-4
Lidocaine	7.7	29	2-4
Prilocaine	7.7	25	2-4
Articaine	7.8	29	2-4
Etidocaine	7.9	25	2-4
Ropivacaine	8.1	17	2-4
Bupivacaine	8.1	17	5-8
Tetracaine	8.6	7	10-15
Cocaine	8.6	7	—
Chloroprocaine	8.7	6	6-12
Propoxyphene	8.9	4	9-14
Procaine	9.1	2	14-18
Procainamide	9.3	1	—

۲- گزینه «الف» صحیح است.

☞ فصل ۲ مالامد

بی حس کننده‌های موضعی باعث ایجاد دپشن میوکارد می‌شوند که مربوط به سطح خون بی حس کننده موضعی است. بی حس کننده‌های موضعی باعث کاهش تحریک‌پذیری الکتریکی میوکارد، کاهش سرعت هدایت و کاهش نیروی انقباض می‌شوند.

مزیت درمانی این عمل دپشن در مدیریت میوکارد بیش از حد تحریک‌پذیر است که خود را به صورت دیس ریتمی‌های مختلف نشان می‌دهد. اگرچه بسیاری از بی حس کننده‌های موضعی اثرات ضد دیس ریتمیک در

حیوانات نشان داده اند، تنها پروکائین و لیدوکائین، اطمینان بالینی قابل توجهی در انسان به دست آورده‌اند. لیدوکائین پرمصرف‌ترین بی‌حس کننده موضعی است که در این زمینه به شدت مورد مطالعه قرار گرفته است.

۳- گزینه «د» صحیح است.

◀ مالامد اورژانس- جزو منابع حال حاضر دستیاره نیست.

۴- گزینه «ج» صحیح است.

◀ مالامد اورژانس- جزو منابع حال حاضر دستیاره نیست.

۵- گزینه «الف» صحیح است.

◀ مالامد اورژانس- جزو منابع حال حاضر دستیاره نیست.

در فصل ۲ پیترسون ۱۹، در درمان اورژانس سندرم هیپرونوتیلاسیون و تشنج ناشی از مسمومیت با داروی بی‌حسی تزریق میدازولام بیان شده است.

۶- گزینه «ب» صحیح است.

◀ مالامد اورژانس- جزو منابع حال حاضر دستیاره نیست.

سنکوپ واژودپرسور همان سنکوپ واژوآگال است. در فصل ۲ پیترسون ۲۰۱۹ بیان شده است که در این حالت ابتدا سمپاتیک فعال شده و علائم ناشی از آن مانند گشادشدن عروق عضلات و تاکی کاردی بروز می‌کند. سپس پاراسمپاتیک به واسطه عصب واگ فعال شده که منجر به برادی کاردی افت فشار خون و در نهایت از دست رفتن هوشیاری می‌شود.

۷- گزینه «ج» صحیح است.

◀ فصل ۱ پیترسون

موقعیت upright جهت درمان بیماران COPD به دلیل امکان تنفس راحت‌تر ارجح است. همچنین در بیماران مبتلا به COPD بهتر از جلسه درمان در بعد از ظهر باشد تا فرصت کافی برای تخلیه ترشحات روزانه باشد.

۸- گزینه «ب» صحیح است.

◀ فصل ۲ پیترسون

اگر بیمار علائمی از سرفه، تنگی نفس و دیسترنس تنفسی نشان دهد دندان آسپیره شده و در غیر این صورت آن را بعلیه دارد. اگر علائم تنفسی مشاهده شد می‌توان برای بیمار اکسیژن مکمل تجویز کرد. در هر دو حالت بیمار به اورژانس منتقل می‌شود. برای تعیین موقعیت دندان رادیوگرافی شکم و قفسه سینه اخذ می‌شود. در صورت آسپیراسیون از برونوکوسکوپی برای خارج کردن آن استفاده می‌شود و در صورت بلع، دندان ۲-۴ روز بعد همراه مدفوع دفع خواهد شد.

۹- گزینه «د» صحیح است.

◀ فصل ۱۳ پیترسون

تکنیک وستیبولوپلاستی موضعی با اپی تلیالیزاسیون ثانویه زمانی سومند است که قاعده فرنوم بسیار پهن باشد مانند بسیاری از فرنوم‌های قدمای مندبیل و لترال مانگزیلا. در این روش برش به صورت سوپراپریوستال داده شده و در امتداد مارژین‌های فرنوم، بافت مخاطی و زیرمخاطی از پریوست جدا می‌شود. لبه‌های مخطی در عمیق‌ترین نقطه وستیبول به پریوست بخیه می‌شود. مابقی پریوست راه‌ها می‌شود تا به صورت ثانویه بهبدود یابد. اغلب یک