

## فهرست

۶.....	پیشگفتار.....
۷.....	سوالات ارتقاء ۹۸.....
۲۰.....	پاسخنامه ارتقاء ۹۸.....
۳۹.....	سوالات بورد ۹۸.....
۵۲.....	پاسخنامه بورد ۹۸.....
۷۰.....	سوالات بورد ۹۹.....
۸۳.....	پاسخنامه بورد ۹۹.....
۱۰۱.....	سوالات بورد ۱۴۰۰.....
۱۱۴.....	پاسخنامه بورد ۱۴۰۰.....
۱۳۳.....	سوالات ارتقا ۱۴۰۱.....
۱۴۵.....	پاسخنامه ارتقا ۱۴۰۱.....
۱۶۴.....	سوالات بورد ۱۴۰۱.....
۱۷۷.....	پاسخنامه بورد ۱۴۰۱.....

## پیشگفتار

### به نام خدا

در سالهای اخیر آزمون مورد تخصصی بیماری‌های دهان، فک و صورت و سوالات مطرح شده از این درس در آزمون ورودی دستیاری سبک و سیاق متفاوتی را نسبت به سالهای گذشته پیش‌رو گرفته است. توجه به مفهوم مطالب موجود در منابع بیش از تکیه بر محفوظات مورد توجه طراحان قرار گرفته است. همچنین طراحی سوالات به صورت کیس‌های بالینی در قالب سوالات تئوری سطح این آزمون‌ها را دشوارتر ساخته است.

لذا در راستای رفع مشکلات فوق و ارتقای سطح آموزشی فراگیران بر آن شدیم که مجموعه سوالات آزمون‌های کتبی ارتقا و دانشنامه تخصصی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ را در این کتاب جمع‌آوری نماییم. همچنین پاسخ‌های تشریحی ارائه شده از منابع منتخب و مطابق پاسخ‌نامه‌ی نهایی وزارت بهداشت گردآوری شده است. با این امید که مورد استفاده دانشجویان، دستیاران و همکاران محترم واقع گردد.

این اثر در امتداد سوالات مورد و ارتقای سالهای ۹۵ تا ۹۷ می‌باشد و علی‌رغم تلاش فراوان این نوشته را خالی از اشکال و ایراد نمی‌دانیم و از همه خوانندگان عزیز خواهشمندیم پیشنهادات و نقطه نظرات ارزنده خود را از ما دریغ نمایند که در چاپ‌های آتی بر غنای مطالب افزوده شود.

لازم به ذکر است کتاب پیش رو قبلاً توسط سرکار خانم دکتر فتاحی با همکاری دکتر فقیهیان نگارش شده بود که مورد بازنگری کامل قرار گرفته است و به منظور مجموعه‌سازی دوباره مورد تجدید چاپ قرار گرفته است.

با احترام

**گروه مولفین**

zamani.arezoo@skums.ac.ir

e.faghihian@dent.mui.ac.ir

زمستان ۱۴۰۱

## سوالات ارتقاء سال ۹۸

- ۱- کدامیک از بی‌حسی‌های زیر در خانم باردار تحت همه شرایط قابل تجویز است؟  
(الف) پریلوکاین (ب) مپی واکاین  
(ج) بوپی واکاین (د) آرتی کاین
- ۲- برای درمان کاندیدیازیس دهانی اولیه مقاوم به درمان فلوکونازول کدام دارو مناسب‌تر است؟  
(الف) کلوتریمازول (ب) کتوکانازول  
(ج) میکونازول (د) ایتراکونازول
- ۳- در بیمار با دریچه‌ی مصنوعی قلب تحت درمان با وارفارین، کدام درمان دارویی زیر جهت کنترل درد طی ۲۴ ساعت اول پس از درمان‌های دندانپزشکی مناسب‌تر است؟  
(الف) ایبوپروفن ۸۰۰ میلی‌گرم (ب) سلکوکسیب ۴۰۰ میلی‌گرم  
(ج) استامینوفن ۱۰۰۰ میلی‌گرم (د) پردنیزولون ۲۰ میلی‌گرم
- ۴- در بیماری با افزایش حساسیت به پروتئین شیر، کدامیک از داروها منع مصرف دارد؟  
(الف) نیستاتین (ب) کلوتریمازول  
(ج) میکونازول (د) فلوکونازول
- ۵- بیماری با شکایت از عود زیاد ضایعات تاولی و زخمی در لب مراجعه کرده است. برای پیشگیری از عود بیماری کدام روش تجویز اسیکلوویر مناسب‌تر است؟  
(الف) tab 200 mg bid (ب) cap 400 mg tid  
(ج) cap 500 mg qd (د) tab 400 mg bid
- ۶- خانم ۴۵ ساله با شکایت از زخم‌های منتشر دهانی که از ۲ ماه قبل شروع شده، به شما مراجعه کرده است. در معاینه به عمل آمده زخم‌های بزرگ منتشر با شکل نامنظم دیده شده است و بر روی لب نیز کراست وجود دارد. بیمار در ناحیه زیر سینه و اطراف ناف دارای چند تاول به اندازه یک سانتی‌متر می‌باشد. در ضمن بیمار گهگاه سرفه می‌کند. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟  
(الف) Erythema Multiforme (ب) Mucous Membrane Pemphigoid  
(ج) paraneoplastic pemphigus (د) Epidermolysis Bullosa Acquisita

## پاسخنامه ارتقاء سال ۹۸

۱- گزینه «الف» صحیح است.

Ⓒ (برکت ۲۰۱۵ جلد اول، فصل ۳، صفحه ۶۲ جدول ۲۸-۳)

در بیمار باردار، جهت بی‌حسی موضعی، آرتی کائین، بویی واکائین، مپی واکائین باید با احتیاط به کار رود در حالی که پریلوکائین و لیدوکائین در همه‌ی شرایط قابل تجویز است.

۲- گزینه «د» صحیح است.

Ⓒ (برکت ۲۰۱۵ جلد اول، فصل ۳، صفحه ۴۶)

بیماران با کاندیدیازیس متوسط تا شدید باید به وسیله ضد قارچ‌های سیستمیک درمان شوند. محلول ایتراکونازول یا پساکونازول عوامل انتخابی اولیه در مواردی هستند که به درمان فلوکونازول مقاوم می‌باشند.

۳- گزینه «ب» صحیح است.

Ⓒ (برکت ۲۰۱۵ جلد اول، فصل ۳، صفحه ۵۰)

داروهای انتخابی برای درمان درد دهانی صورتی Nociceptive، استامینوفن و NSAIDها می‌باشند اما برای بیماری که از ضدانعقادهای خونی مانند ریواروکسابان، آپیکسابان، دابیکاتران یا وارفارین، استفاده می‌کنند، یک مهارکننده‌ی آنزیم COX2 مانند Celecoxib می‌تواند جایگزین ایبوپروفن ۶۰۰ میلی‌گرم تجویز شود. به صورت ۲۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت برای ۲۴ ساعت اولیه بعد از عملی جراحی تجویز شود.

۴- گزینه «ج» صحیح است.

Ⓒ (برکت ۲۰۱۵ جلد اول، فصل ۳، صفحه ۴۵ جدول ۱۱-۳)

براساس جدول فوق، ازدیاد حساسیت به پروتئین شیر به عنوان کنتراندیکاسیون میکونازول بیان شده است. عوارض جانبی میکونازول شامل خارش لثه، سوزش، دندان درد، تهوع، استفراغ، اسهال و اختلال چشایی می‌باشد.

۵- گزینه «د» صحیح است.

Ⓒ (برکت ۲۰۱۵ جلد اول، فصل ۳، صفحه ۴۳ - جدول ۹-۳)

با توجه به جدول فوق، جهت پیشگیری از RHL در افراد بزرگسال آسیکلوویر ۴۰۰ میلی‌گرم ۲ بار در روز و والاسیکلوویر ۵۰۰ میلی‌گرم یک بار در روز تجویز می‌شود.

۶- گزینه «ج» صحیح است.