

فهرست

۷	پیشگفتار
۹	فصل ۵: جراحی‌های دندان‌های نهفته
۱۵	پاسخنامه فصل ۵
۱۸	فصل ۶: جراحی‌های پیش پروتزی و بازسازی
۲۳	پاسخنامه فصل ۶
۲۶	فصل ۷: جراحی‌های دنتوالوئولار در کودکان
۲۹	پاسخنامه فصل ۷
۳۰	فصل ۳۸: اصول و درمان عفونت‌های ماگزیلوفاسیال
۳۶	پاسخنامه فصل ۳۸
۴۱	فصل ۳۹: استئومیلیت، استئورادئونکروز و BRONJ
۴۵	پاسخنامه فصل ۳۹
۴۸	فصل ۴۰: فلپ‌های موضعی و ناحیه‌ای
۵۴	پاسخنامه فصل ۴۰
۵۹	فصل ۴۱: بازسازی عروقی و غیر عروقی بافت نرم و سخت
۶۸	پاسخنامه فصل ۴۱

پیشگفتار

کتاب جراحی دهان، فک و صورت پیترسون تخصصی یکی از مهم‌ترین و معتبرترین منابع جراحی فک و صورت می‌باشد که توسط مولفین مطرح در این رشته تدوین و گردآوری شده است. ویرایش سوم این کتاب در سال ۲۰۱۱ به چاپ رسیده است. کتاب حاضر مجموعه سوالات فصول منتخب بورد و ارتقا جراحی دهان، فک و صورت پیترسون تخصصی می‌باشد، کتاب مذکور با هدف مرور و فراگیری سریع مطالب مهم می‌باشد که در اختیار متخصصین محترم و دستیاران گرامی رشته جراحی فک و صورت قرار می‌گیرد.

در نگارش این مجموعه تست سعی شده تمام سوالات مهم به همراه پاسخنامه که در فهم مطلب موثر می‌باشد آورده شود. بدیهی است دستیاران گرامی جهت به دست آوردن نتیجه مطلوب در امتحانات دستیاری و بورد نیاز به مطالعه کتاب اصلی می‌باشند اما با توجه به حجم بالای کتب جراحی فک و صورت این مجموعه سوالات می‌تواند در امتحانات ارتقا و بورد جهت مرور سریع نکات بسیار موثر باشد.

از زحمات انتشارات رویان پژوه که در صفحه آرایی، تدوین و چاپ این کتاب از هیچ تلاشی فروگذار نکردند صمیمانه تشکر می‌نمایم.

دکتر مهرداد دهقانپور

رتبه اول بورد تخصصی

استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فصل ۵: جراحی های دندان های نهفته

۱- ترتیب شیوع نهفتگی دندان های دائمی زیر کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟ (از راست به چپ)

- (الف) مولر سوم مندیبل و ماگزایلا-کانین ماگزایلا-پره مولر مندیبل-پره مولر ماگزایلا-مولر دوم
(ب) مولر سوم مندیبل و ماگزایلا-کانین ماگزایلا-پره مولر ماگزایلا-پره مولر مندیبل-مولر دوم
(ج) مولر سوم مندیبل و ماگزایلا-کانین ماگزایلا-پره مولر ماگزایلا-مولر دوم-پره مولر مندیبل
(د) مولر سوم مندیبل و ماگزایلا-کانین ماگزایلا-پره مولر مندیبل-مولر دوم-پره مولر ماگزایلا

۲- علت نهفتگی دندان های دائمی در تمامی موارد زیر به علت فاکتورهای سیستمیک می باشد به جز؟

- (الف) بیماری های تب دار
(ب) رادیوتراپی
(ج) هیپوتیرویدیسم
(د) شکاف لب و کام

۳- در تمامی زیر موقعیت کانین ماگزایلا می تواند به صورت پالاتالی باشد به جز؟

- (الف) وجود فضای اضافه در ماگزایلا
(ب) آؤنزی لترال
(ج) کمبود فضا در قوس ماگزایلا
(د) لترال پگ شکل

۴- طبق نظر به Ranat علل نهفتگی مولر دوم ماگزایلا کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- (الف) موقعیت اکلوزالی و پالاتالی مولر سوم ماگزایلا نسبت به مولر دوم
(ب) موقعیت اکلوزالی و باکالی مولر سوم ماگزایلا نسبت به مولر دوم
(ج) موقعیت مزبالی و پالاتالی مولر سوم ماگزایلا نسبت به مولر دوم
(د) موقعیت مزبالی و باکالی مولر سوم ماگزایلا نسبت به مولر دوم

۵- مولر سوم می که در ۱۸ سالگی نهفته می باشد چند درصد احتمال دارد که در ۲۵ سالگی به صورت

کامل رویش یابد؟

- (الف) ۲۰ تا ۴۰ درصد
(ب) ۳۰ تا ۵۰ درصد
(ج) ۴۰ تا ۶۰ درصد
(د) ۱۰ تا ۳۰ درصد

۶- جوانه مولر سوم مندیبل چند سالگی در OPG مشاهده می شود؟

- (الف) ۸ سالگی
(ب) ۱۰ سالگی
(ج) ۹ سالگی
(د) ۱۱ سالگی

۷- کامل شدن تاج و ریشه مولر سوم مندیبل با اپکس باز در چند سالگی اتفاق می افتد؟ (از راست به چپ)

- الف) ۱۴-۱۶ سالگی
 ب) ۱۶-۱۸ سالگی
 ج) ۱۴-۱۸ سالگی
 د) ۱۶-۲۰ سالگی

۸- مولر سوم مندیبل در چند سالگی در موقعیت نهایی خود قرار می گیرد؟

- الف) ۲۰ سالگی
 ب) ۲۵ سالگی
 ج) ۱۸ سالگی
 د) ۲۲ سالگی

۹- تمامی موارد زیر در مورد نهفتگی مولر سوم مندیبل صحیح است به جز؟

- الف) رشد کم ریشه مزایالی باعث نهفتگی مزیانگولار می شود
 ب) رشد زیاد ریشه مزایالی باعث نهفتگی دیستوانگولار می شود
 ج) رشد زیاد ریشه دیستال باعث نهفتگی مزیانگولار شدید افقی می شود
 د) رشد کم ریشه مزایالی باعث نهفتگی دیستوانگولار می شود

۱۰- مهم ترین علت نهفتگی مولر سوم مندیبل کدام مورد زیر می باشد؟

- الف) عدم تصحیح موقعیت مولر سوم از مزیانگولار به عمودی
 ب) کمبود فضا در قوس فکی
 ج) تراکم زیاد استخوان ریج مایل خارجی
 د) رشد سریع فک

۱۱- بهترین محدوده سنی جهت ارزیابی موقعیت کائین ماگز یا توسط رادیوگرافی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف) ۱۰ تا ۱۳ سالگی
 ب) ۹ تا ۱۲ سالگی
 ج) ۱۳ تا ۱۵ سالگی
 د) ۱۱ تا ۱۴ سالگی

۱۲- شایع ترین علت جراحی دندان عقل نهفته بعد از ۲۰ سالگی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف) پرپودونتایتیس
 ب) پوسیدگی
 ج) پری کروناپتیس
 د) کیست و تومور

۱۳- تمامی باکتری های زیر از علت پری کروناپتیس می باشند به جز؟

- الف) پپتواستروکوک
 ب) فوززوباکتر
 ج) پورفیروموناس
 د) سودوموناس

۱۴- چند درصد از دندان های مولر سوم مندیبل به علت پری کروناپتیس کشیده می شوند؟

- الف) ۱۵ تا ۲۰ درصد
 ب) ۲۵ تا ۳۰ درصد
 ج) ۳۰ تا ۳۵ درصد
 د) ۱۰ تا ۲۰ درصد

۱۵- چند ماه قبل از جراحی ارتوگناتیک دندان های عقل نهفته باید خارج گردد؟

- الف) ۶ تا ۱۲ ماه
 ب) ۱۲ تا ۱۶ ماه
 ج) ۶ تا ۸ ماه
 د) ۸ تا ۱۰ ماه

پاسخنامه فصل ۵

- ۱- گزینه «الف» صحیح است.
- ۲- گزینه «د» صحیح است.
شکاف لب و کام از علل فاکتورهای موضعی نهفتگی دندان‌های دائمی می‌باشد.
- ۳- گزینه «ج» صحیح است.
در صورت کمبود فضا در قوس ماگزبلا موقعیت کانین به صورت باکالی خواهد بود
- ۴- گزینه «الف» صحیح است.
- ۵- گزینه «ب» صحیح است.
- ۶- گزینه «ج» صحیح است.
جوانه مولر سوم در ۹ سالگی در گرافی مشاهده می‌شود و در ۱۱ سالگی مینرالیزسیون کاسپ کامل می‌شود.
- ۷- گزینه «ج» صحیح است.
در ۱۶ سالگی نصف ریشه و در ۱۸ سالگی کل ریشه با اپکس باز تشکیل می‌شود و در ۱۴ سالگی تاج کامل می‌شود.
- ۸- گزینه «الف» صحیح است.
مولر سوم مندیبل در ۲۰ سالگی در موقعیت نهایی خود قرار می‌گیرد و در ۲۴ سالگی ۹۵ درصد رویش مولر سوم کامل شده است
- ۹- گزینه «د» صحیح است.
- ۱۰- گزینه «الف» صحیح است.
- ۱۱- گزینه «الف» صحیح است.
- ۱۲- گزینه «ج» صحیح است.
- ۱۳- گزینه «د» صحیح است.
- ۱۴- گزینه «ب» صحیح است.
- ۱۵- گزینه «الف» صحیح است.